



Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI)
i Nørre Møllebæk og Spang Å
ved Rakkeby Dambrug i 2015

Orbicon, april 2015

Rekvirent

Morsø Kommune
Natur og Miljø
Team Natur og Landbrug
Jernbanegade 7
7900 Nykøbing Mors
Jens Ejner Jørgensen
Telefon 99 70 70 68
E-mail: jjo@morsoe.dk

Rådgiver

Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J
Per Nissen Grøn
Telefon 29 26 02 90
E-mail pngr@orbicon.dk

Sag	1321300024
Rapport	Per Nissen Grøn
Udgivet	15. april 2015

**Dansk Vandløbsfauna Indeks
(DVFI) i Nørre Møllebæk og
Spang Å ved Rakkeby Dam-
brug i 2015**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Baggrund og formål med undersøgelsen	3
2	Metoder ved undersøgelsen.....	4
3	Vandløbskvaliteten i vandløbene	6
3.1	Fysiske og vegetationsmæssige forhold	6
3.2	Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI).....	12
3.3	DVFI-værdier i perioden 1999-2015	15
3.4	Konklusion	15
4	Referencer.....	17
5	Bilag	18
5.1	Bilag 1: Artlister for stationerne i 2015	19
5.2	Bilag 2: DVFI-værdier for årene 1999-2014.....	20

1 Baggrund og formål med undersøgelsen

Morsø Kommune er forpligtiget til mindst 1 gang om året i marts eller april, at vurdere vandløbskvaliteten opstrøms og nedstrøms ferskvandsdambrug, som ligger ved vandløb i kommunen. Vurderingen sker ved indsamling af en standardiseret prøve af smådyrsfaunaen i vandløbet opstrøms og nedstrøms dambruget. Smådyrene omfatter vandlevende individer som fimreorme, børsteorme, krebsdyr, vandinsekter, snegle og muslinger.

På baggrund af denne standardiserede indsamling af smådyr i vandløbet og en efterfølgende artsbestemmelse af dyrene under mikroskop i laboratoriet, udregnes på baggrund af artssammensætningen og antallet af smådyr et Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Metoden er Miljøstyrelsens officielle metode ved bedømmelsen af den biologiske vandløbskvalitet i vandløb (Miljøstyrelsen, 1998; Danmarks Miljøundersøgelser, 2010).

Formålet med nærværende undersøgelse har således været at bestemme DVFI-værdier i Nørre Møllebæk samt i Spang Å opstrøms og nedstrøms Rakkeby Dambrug for at kunne vurdere, om dambrugsdriften påvirker vandløbskvaliteten. Nørre Møllebæk løber til Spang Å før dambrugets udløb i åen. Prøvetagningen er gennemført af Orbicon A/S den 17. marts 2015.



Spang Å er et mellemstort vandløb, som er reguleret i størstedelen af sit forløb gennem hovedsagelig landbrugsarealer. Vandløbet har på stækningen ved Rakkeby Dambrug et godt fald over sandet, gruset og stenet bund. Vandløbet er noget præget af sandvanding med sandaflejringer, men har gode fysiske forhold som følge af et godt fald og et groft bundsubstrat bestående af en del grus og sten. Her ses Spang Å ved udløbet fra dambruget. Foto: 17. marts 2015.

2 Metoder ved undersøgelsen

Tidspunkt for prøvetagningen

Prøvetagningen er gennemført den 17. marts 2015 af Per Nissen Grøn, Orbicon A/S, som også har stået for artsbestemmelsen af smådyrene.

Metoder ved undersøgelsen

Der er indsamlet en smådyrsprøve i Nørre Møllebæk og tre smådyrsprøver i Spang Å ved Rakkeby Dambrug i overensstemmelse med Miljøstyrelsens standardiserede metode (Miljøstyrelsen, 1998; Danmarks Miljøundersøgelser, 2010). Det omfatter således ud over en standardiseret prøvetagning også en sortering og bearbejdning af prøverne i laboratoriet, herunder artsbestemmelse af smådyrene under mikroskop.

Prøven i Nørre Møllebæk, der løber til Spang Å, er taget ved Blåbergvej. Prøverne i Spang Å er taget dels 100 m opstrøms dambrugets udløb og dels 100 m nedstrøms dambrugets udløb. Desuden er der i Spang Å taget en prøve lige nedstrøms dambrugets udløb og opstrøms tre rørudløb, jf. figur 1. I tabel 1 er anført UTM-kordinater for de fire prøvetagningssteder.

Vandløb	Stationsnummer	Placering	Placering (UTM)
Nørre Møllebæk	2416-00002	Tilløb til Spang Å	0476579/6291335
Spang Å	2412-00014	100 m nedstrøms	0476177/6291074
Spang Å	2412-00015	Nedstrøms ved 3 rør	0476275/6291057
Spang Å	2412-00016	100 m opstrøms	0476452/6291041

Tabel 1

Oversigt over UTM-kordinater for de fire prøvetagningssteder for smådyr (DVFI-prøver) i Nørre Møllebæk og Spang Å ved Rakkeby Dambrug, 17. marts 2015.

Smådyrsprøven består af en standardiseret sparkeprøve, som er indsamlet med en vandketsjer med en maskevidde på 0,5 mm samt en pilleprøve, der er indsamlet med en pincet. Sparkeprøven og pilleprøven er konserveret i felten med ethanol og hjemtaget til laboratoriet til udsortering.

I laboratoriet er både grovsorteringen af sparkeprøven og bestemmelsen af smådyrene til arter sket ved hjælp af mikroskop. Anvendelsen af mikroskop til grovsorteringen sikrer, at også de helt små dyr kommer med ved sorteringen af prøven. For enkelte af dyregrupperne, som har været meget talrigt tilstede, dvs. med mere end 100 individer, er optællingen af antallet af dyr optalt i en delmængde af prøven.

Artsbestemmelsen for de forskellige smådyrsgrupper i sparkeprøven og pilleprøven er sket til et niveau, som er i overensstemmelse med vejledningen. Det vil sige til enten art, slægt eller familie. Disse indgår i DVFI-systemet som nøglegrupper eller diversitetsgrupper, herunder enten som negative eller positive diversitetsgrupper.

På baggrund af antallet af nøglegrupper og diversitetsgrupper udregnes en DVFI-værdi, der kan antage værdier fra 1 til 7, hvor 1 er den dårligste og 7 er den bedste. De fleste fiskevandsmålsatte vandløb vil kræve en DVFI-værdi på 5, men i nogle tilfælde vil en værdi på 4 være acceptabel.



Figur 1.

Placeringen af DVFI-stationer i Nørre Møllebæk samt i Spang Å opstrøms og nedstrøms Rakkeby Dambrug, 17. marts 2015. Station 2416-00002 ligger i Nørre Møllebæk ved Blåbergvej og har UTM-kordinaterne 0476579/6291335. Station 2412-00014 ligger 100 m nedstrøms dambrugets udløb og har UTM-kordinaterne 0476177/6291074. Station 2412-00015 ligger opstrøms tre rørudløb og nedstrøms udløbet fra dambruget og har UTM-kordinaterne 0476275/6291057. Station 2412-00016 ligger 100 m opstrøms dambrugets udløb og har UTM-kordinaterne 0476452/6291041. Både Nørre Møllebæk og Spang Å løber hovedsagelig gennem landbrugsarealer og har et godt fald med en sandet, gruset og stenet vandløbsbund.

3 Vandløbskvaliteten i vandløbene

3.1 Fysiske og vegetationsmæssige forhold

Nørre Møllebæk

På stækningen med prøvestationen er Nørre Møllebæk delvis naturligt slynget gennem landbrugsarealer. Vandløbet har ret gode fysiske forhold med et godt fald over sandet, gruset og stenet bund, der kun er præget af lidt sandvandring. Strækningssvis findes grus- og stenstryg. På undersøgelsestidspunktet var der kun ganske lidt aflejringer af brunt slam og dødt plantemateriale langs bredderne. Der var ingen bakteriefilm på vandplanter og sten samt næsten ingen bevoksninger af kiselalger. Vandet var klart og uden nogen lugt.

Vandplanterne dækkede gennemsnitlig ca. 20% af vandløbsbunden og fandtes især langs bredderne. Smalbladet mærke var hyppigst forekommende og især langs bredderne. Desuden fandtes bevoksninger af fladfrugtet vandstjerne, smalbladet vandstjerne, vandkarse, almindelig kildemos, seglmos, manna-sødgræs, kryb-hvene, knæbøjet rævehale og rørgræs. Der var ikke nogen bevoksninger af grønne trådalger.

Spang Å 100 m opstrøms dambrugets udløb

På prøvestationen 100 m opstrøms dambruget er Spang Å reguleret og har et lige forløb. Vandløbet har imidlertid en ret god fysisk variation, idet det har et godt fald over sandet, gruset og stenet bund, der kun er præget af lidt sandvandring. På undersøgelsestidspunktet var der kun ganske lidt aflejringer af brunt slam, dødt plantemateriale, bevoksninger af kiselalger og bakteriefilm på sten og vandplanter. Vandet var klart og uden nogen lugt.

Vandplanterne dækkede gennemsnitlig ca. 30% af vandløbsbunden og var domineret af smalbladet mærke, fladfrugtet vandstjerne og vandranunkel. Desuden fandtes bevoksninger af smalbladet vandstjerne, almindelig kildemos, seglmos, eng-forglemmigej, vandmynte, lådden dueurt, tykskulpet brøndkarse, vandkarse, manna-sødgræs, kryb-hvene, knæbøjet rævehale og rørgræs. Der var ganske lidt bevoksninger af grønne trådalger af duskvandhår (*Cladophora glomerata*).

Spang Å mellem dambrugets udløb og tre rørudløb

På prøvestationen mellem dambrugets udløb og de tre rørudløb har Spang Å et reguleret og lige forløb. Der er gode fysiske forhold, idet vandløbet har et godt fald over sandet, gruset og stenet bund, der kun er lidt præget af sandvandring. På halvdelen af strækningen er der stenstryg. På undersøgelsestidspunktet var der lidt aflejringer af brunt slam og dødt plantemateriale samt bevoksninger af kiselalger. Sten og vandplanter havde også kun lidt bakteriefilm. Vandet var klart og uden dambrugslugt. I det sydligste rørudløb nedstrøms dambrugets udledning var der lidt lammehaler i røret.

Vandplanterne dækkede gennemsnitlig ca. 20% af vandløbsbunden og var domineret af smalbladet mærke og fladfrugtet vandstjerne. Herudover fandtes bevoksninger af vandranunkel, fladfrugtet vandstjerne, almindelig kildemos, seglmos, lådden dueurt, eng-forglemmigej, manna-sødgræs, kryb-hvene, rørgræs, knæbøjet rævehale og lyse-siv. Desuden var der lidt bevoksninger af grønne trådalger.

Spang Å 100 m nedstrøms dambrugets udløb

På prøvestationen 100 m nedstrøms dambrugets udløb har Spang Å et reguleret og lige forløb. Der er forholdsvis gode fysiske forhold som følge af, at vandløbet har et godt fald over sandet, gruset og stenet bund, der er lidt præget af sandvandring. Stedvis er der grus- og stenstryg. På undersøgelsestidspunktet var der lidt aflejringer af brunt slam og dødt plantemateriale samt bevoksninger af kiselalger på vandplanter og sten. Desuden var der lidt bakteriefilm på sten og planter. Vandet var klart og uden dambrugslugt.

Vandplanterne dækkede gennemsnitlig ca. 20% af vandløbsbunden og var domineret af smalbladet mærke, vandranunkel og fladfrugtet vandstjerne. Desuden fandtes bevoksninger af smalbladet vandstjerne, almindelig kilde- mos, seglmos, eng-forglemmigej, lådden dueurt, vandkarse, tykskulpet brøndkarse, manna-sødgræs, kryb-hvene, knæbøjet rævehale og rørgæs. Desuden var der lidt bevoksninger af grønne trådalger på vandplanter og sten af dusk-vandhår (*Cladophora glomerata*).



Spang Å er reguleret og har et lige forløb langs Rakkeby Dambrug. Vandløbet har imidlertid et godt fald i hele sit forløb, og vandløbsbunden er sandet, gruset og stenet med mange grus- og stenstryg. Der er således ret gode fysiske forhold i vandløbet trods det regulerede forløb, og vandet er klart. Flere steder er der gydeområder for ørreder. Der findes en forholdsvis veludviklet vegetation bestående af især de vintergrønne vandplanter, smalbladet mærke, vandstjerne og vandranunkel. Foto: 17. marts 2015.



Nørre Møllebæk er delvis naturligt slynget på strækningen med prøvestationen. Vandløbet har ret gode fysiske forhold med et godt fald over en fast bund med sand, grus og sten. Prøvestationen har UTM-koordinaterne: 0476579/6291335. Foto: 17. marts 2015.



Nørre Møllebæk har et godt fald over sandet, gruset og stenet bund. På prøvetagnings-tidspunktet var der næsten ingen aflejringer af brunt slam eller forekomst af kiselalger på bunden. Der var lidt bevoksninger af vandplanter langs bredderne og ude i vandløbet, især af vandstjerne og smalbladet mærke. Foto: 17. marts 2015.



Spang Å er reguleret og har et lige forløb opstrøms udløbet fra dambruget. Vandløbet har dog ret gode fysiske forhold med et godt fald over en sandet, gruset og stenet bund. Prøvestationen har UTM-koordinaterne: 0476177/6291074. Foto: 17. marts 2015.



Spang Å har opstrøms dambrugets udløb varierede fysiske bundforhold med sand, grus og sten. På prøvetagningstidspunktet var der kun lidt aflejringer af brunt slam, kiselalger og bakteriefilm. Der var en del bevoksninger af vandplanter i vandløbet, især af vandstjerne, vandranunkel og smalbladet mærke. Foto: 17. marts 2015.



Spang Å er reguleret og har et lige forløb på strækningen nedstrøms dambrugets udløb og opstrøms de tre rørudløb. Vandløbet har imidlertid ret gode fysiske forhold som følge af et godt fald over en fast bund, der er sandet, gruset og stenet. Prøvestationen har UTM-kordinaterne: 0476275/6291057. Foto: 17. marts 2015.



Spang Å har på strækningen nedstrøms dambrugets udløb og opstrøms de tre rørudløb varierede fysiske bundforhold med sand, grus og sten. Der var kun lidt aflejringer af brunt slam, bevoksninger af kiselalger og bakteriefilm. Foto: 17. marts 2015.



Nedstrøms dambrugets udløb og de tre rørdløb har Spang Å et godt fald over sandet, gruset og stenet bund, der er præget af sandvandring. Smådyrsprøven er taget på denne strækning, som har UTM-koordinaterne: 0476452/6291041. Foto: 17. marts 2015.



Spang Å havde en sandet, gruset og stenet bund nedstrøms dambrugets udløb og de tre rørdløb. Der var lidt aflejringer af brunt slam og bevoksninger af brune kiselalger. Desuden var der lidt bakteriefilm på sten og vandplanter. Foto: 17. marts 2015.

3.2 Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI)

I tabel 1 er anført en oversigt over antal arter og individer samt DVFI-værdi for stationen i Nørre Møllebæk og de tre stationer i Spang Å. I bilaget findes de samlede artslistes for de fire stationer.

Vandløb	Stations nr.	Placering	Antal arter	Antal individer	Sum diversitetsgrupper	DVFI-værdi
Nørre Møllebæk	2416-00002	Tilløb til Spang Å	47	1185	8	5
Spang Å	2412-00014	100 m nedstrøms	42	1606	4	5
Spang Å	2412-00015	Nedstrøms før 3 rør	48	1773	5	5
Spang Å	2412-00016	100 m opstrøms	50	1054	7	5

Tabel 1

Oversigt over antallet af arter, individer og diversitetsgrupper samt DVFI-værdi for stationen i Nørre Møllebæk og tre stationer i Spang Å ved Rakkeby Dambrug, 17. marts 2015. Summen af diversitetsgrupper er lig med antallet af positive diversitetsgrupper minus antallet af negative diversitetsgrupper.

Nørre Møllebæk

På stationen i Nørre Møllebæk er smådyrslivet artsrigt med 47 arter/grupper af smådyr og er domineret af slørvingen *Amphinemura sulcicollis*, som udgør knap halvdelen af det samlede antal smådyr i prøven. Desuden er døgnflueslægten *Baetis* og dyndsneglen *Potamopyrgus antipodarum* talrige, idet de tilsammen udgør en tredjedel af antallet af smådyr i prøven. Endvidere er døgnfluen *Leptophlebia marginata* og kvægmyg (Simuliidae indet.) almindelige.

Af rentvandskrævende arter findes døgnfluen *Leptophlebia marginata*, slørvingerne *Amphinemura sulcicollis* og *Nemurella picteti*, billeslægten *Elodes*, de fritlevende vårfluer *Plectrocnemia conspersa* og *Rhyacophila fasciata* samt stankelbenslarven *Pedicia rivosa*. Desuden er de husbyggende vårfluefamilierne Leptoceridae og Limnephilidae repræsenteret, og de omfatter mere eller mindre rentvandskrævende arter. De øvrige arter og grupper på stationen er mere forureningstålende i forhold til forekomsten af organisk stof i vandet.

I forhold til DVFI er der ingen repræsentanter for nøglegruppe 1, mens der er fire repræsentanter for nøglegruppe 2 i form af døgnfluen *Leptophlebia marginata*, slørvingen *Amphinemura sulcicollis*, vårfluen *Rhyacophila fasciata* og klobillen *Elmis aenea*. Der er 11 positive diversitetsgrupper (fimreorme, slørvingeslægterne *Amphinemura*, *Nemoura* og *Nemurella*, døgnfluefamilierne Baetidae og Leptophlebiidae, billeslægterne *Elmis* og *Elodes* samt vårfluefamilierne Rhyacophilidae, Leptoceridae og Limnephilidae) og 3 negative diversitetsgrupper (vandbænkebidere *Asellus aquaticus*, sommerfuglefamilien Pscychodidae og snegleslægten *Lymnaea*). Summen af diversitetsgrupper er 8.

På baggrund af det ovennævnte kan DVFI udregnes til værdien 5, hvilket svarer til en god biologisk vandløbskvalitet. Værdien er tilfredsstillende i relation til vandløbets målsætning "gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk" (B1), som mindst kræver en DVFI-værdi på 5.

Spang Å opstrøms dambruget

På stationen i Spang Å 100 m opstrøms dambruget er smådyrslivet ret artsrigt med 50 arter/grupper af smådyr. Det er domineret af døgnflueslægten *Baetis*,

der næsten udgør halvdelen af antallet af smådyr i prøven samt af slørvingen *Amphinemura sulcicollis* og kvægmyg (Simuliidae indet.), der tilsammen udgør næsten en tredjedel af smådyrene. Desuden er døgnfluen *Leptophlebia marginata* og dyndsneflen *Potamopyrgus antipodarum* forholdsvis talrige.

Af rentvandskrævende arter findes døgnfluen *Leptophlebia marginata*, slørvingerne *Amphinemura sulcicollis*, *Nemoura avicularis* og *Nemurella picteti*, klobillen *Elmis aenea*, de fritlevende vårfluer *Plectrocnemia conspersa* og *Rhyacophila fasciata*. Desuden er den husbyggende vårfluefamilie Leptoceridae og Limnephilidae repræsenteret, og de omfatter mere eller mindre rentvandskrævende arter. Endvidere findes stankelbenet *Pedicia rivosa*. De øvrige arter og smådyrsgrupper på stationen er mere forureningstålende og kan tåle en vis belastning af vandløbet med organisk stof.

I forhold til DVFI er der ingen repræsentanter for nøglegruppe 1, mens der er fire repræsentanter for nøglegruppe 2 i form af døgnfluen *Leptophlebia marginata*, slørvingen *Amphinemura sulcicollis*, vårfluen *Rhyacophila fasciata* og klobillen *Elmis aenea*.

Der er 10 positive diversitetsgrupper (fimreormen *Polycelis nigra*, slørvingeslægterne *Amphinemura*, *Nemurella* og *Nemoura*, døgnfluefamilierne Baetidae og Leptophlebiidae, billeslægten *Elmis* samt vårfluefamilierne Rhyacophilidae, Leptoceridae og Limnephilidae). Der er 3 negative diversitetsgrupper (bruskigleslægten *Helobdella*, vandbænkebideren *Asellus aquaticus* og sommerfuglefamilien Psychodidae). Summen af diversitetsgrupper er derfor 7.

På baggrund af det ovennævnte kan DVFI udregnes til værdien 5, svarende til en god biologisk vandløbskvalitet. Værdien er tilfredsstillende i relation til vandløbets målsætning "gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk" (B1), som mindst kræver en DVFI-værdi på 5.

Spang Å nedstrøms dambruget og opstrøms de tre rørdløb

På stationen nedstrøms dambruget og opstrøms de tre rørdløb er smådyrslivet forholdsvis artsrigt med 48 arter/grupper af smådyr. Dette er domineret af døgnflueslægten *Baetis*, slørvingen *Amphinemura sulcicollis* og kvægmyg (Simuliidae indet.), der tilsammen udgør næsten 90% af det samlede antal smådyr i prøven.

Af rentvandskrævende arter findes døgnfluen *Leptophlebia marginata*, slørvingerne *Amphinemura sulcicollis* og *Nemoura avicularis*, klobillen *Elmis aenea* samt de fritlevende vårfluer *Plectrocnemia conspersa* og *Rhyacophila fasciata*. Desuden er de husbyggende vårfluefamilier Leptoceridae og Limnephilidae repræsenteret, og det omfatter mere eller mindre rentvandskrævende arter. De øvrige arter og grupper på stationen er mere forureningstålende, og flere af disse kan tåle en del belastning af vandløbet med organisk stof.

I forhold til DVFI er der ingen repræsentanter for nøglegruppe 1, mens der er fire repræsentanter for nøglegruppe 2 i form af døgnfluen *Leptophlebia marginata*, slørvingen *Amphinemura sulcicollis*, vårfluen *Rhyacophila fasciata* og klobillen *Elmis aenea*.

Der er 9 positive diversitetsgrupper (fimreormen *Polycelis nigra*, slørvingeslægterne *Amphinemura* og *Nemoura*, døgnfluefamilierne Baetidae og Leptophlebiidae, billeslægten *Elmis* samt vårfluefamilierne Rhyacophilidae, Lep-toceridae og Limnephilidae). Der er 4 negative diversitetsgrupper (bruskigleslægten *Helobdella*, vandbænkebidere *Asellus aquaticus*, sommerfuglefamilien Psychodidae og snegleslægten *Lymnaea*). Summen af diversitetsgrupper er derfor 5.

På baggrund af det ovennævnte kan DVFI udregnes til værdien 5, svarende til en god biologisk vandløbskvalitet. Værdien er tilfredsstillende i relation til vandløbets målsætning "gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk" (B1), som mindst kræver en DVFI-værdi på 5.

Spang Å 100 m nedstrøms dambruget

På stationen 100 m nedstrøms udløbet fra dambruget er smådyrslivet moderat artsrigt med 42 arter/grupper af smådyr og er domineret af kvægmyg (Simuliidae indet.), der udgør halvdelen af antallet af smådyr i prøven. Desuden er dansemyg dominerende og udgør en femtedel af antallet af smådyr i prøven. Dansemyggene omfatter individer af familierne Orthocladinae, Tanypodinae, Diamesinae og Chironominae. Endvidere er døgnflueslægten *Baetis* ret talrig og udgør knap en sjettedel af smådyrene.

Af rentvandskrævende arter findes døgnfluen *Leptophlebia marginata*, slørvingerne *Amphinemura sulcicollis* og *Nemoura avicularis*, klobillen *Elmis aenea* samt de fritlevende vårfluer *Plectrocnemia conspersa* og *Rhyacophila fasciata* samt den husbyggende vårflue *Ecclisopteryx dalecarlica*. Desuden er de husbyggende vårfluefamilier Leptoceridae og Limnephilidae repræsenteret, og det omfatter mere eller mindre rentvandskrævende arter. De øvrige arter er mere tolerante over for en belastning af vandløbet med organisk stof.

I forhold til DVFI er der ingen repræsentanter for nøglegruppe 1, mens der er fire repræsentanter for nøglegruppe 2 i form af døgnfluen *Leptophlebia marginata*, slørvingen *Amphinemura sulcicollis*, vårfluen *Rhyacophila fasciata* og klobillen *Elmis aenea*.

Der er 8 positive diversitetsgrupper (fimreormen *Polycelis nigra*, slørvingeslægterne *Amphinemura* og *Nemoura*, døgnfluefamilierne Baetidae og Leptophlebiidae, billeslægten *Elmis* samt vårfluefamilierne Rhyacophilidae og Limnephilidae). Der er 4 negative diversitetsgrupper (bruskigleslægten *Helobdella*, vandbænkebidere *Asellus aquaticus*, sommerfugleslægten Psychodidae og snegleslægten *Lymnaea*). Summen af diversitetsgrupper er derfor 4.

På baggrund af det ovennævnte kan DVFI udregnes til værdien 5, svarende til en god biologisk vandløbskvalitet. Værdien er tilfredsstillende i relation til vandløbets målsætning "gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk" (B1), som mindst kræver en DVFI-værdi på 5.

3.3 DVFI-værdier i perioden 1999-2015

I tabel 2 er anført DVFI-værdien for stationen i Nørre Møllebæk og de tre stationer i Spang Å ved Rakkeby Dambrug i årene 1999-2015.

Stations nr.	Placering	DVFI-værdi														
		1999	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2416-00002	Nørre Møllebæk	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	
2412-00014	100 m nedstrøms	-	-	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	4	4	5
2412-00015	Nedstrøms ved 3 rør	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	4	4	5	5
2412-00016	100 m opstrøms	4	5	5	-	5	-	4	5	5	5	4	5	5	5	5

Tabel 2

Oversigt over Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) for stationen i Nørre Møllebæk og de tre stationer i Spang Å ved Rakkeby Dambrug, 1999-2015. Data er fra Miljøportalen, jf. bilag 2.

I Nørre Møllebæk har DVFI-værdien været 5 de fleste af årene i perioden 1999-2015, og det er kun enkelte år, at den har været 4, således i 2000, 2007 og 2008. De seneste seks år fra 2009 til 2015 har værdien været 5, dvs. der har været en god biologisk vandløbskvalitet, og kravet til DVFI-værdi har været opfyldt i forhold til målsætningen B1 for vandløbet.

I Spang Å 100 m opstrøms udløbet fra dambruget har DVFI-værdien også været 5 de fleste år, og den har kun været 4 enkelte år. De seneste fire år i perioden 2012-2015 har værdien være 5, hvor der således har været en god biologisk vandløbskvalitet. I forhold til vandløbets målsætning B1 har DVFI-værdien været opfyldt de seneste fire år.

I Spang Å 100 m nedstrøms udløbet fra dambruget har DVFI-værdien varieret mellem 3 og 5 i årene 2003-2013. Den var 5 i de tre år fra 2010-2012, men den faldt til 4 i 2013 og 2014. I 2015 var den 5, og der var således en god biologisk vandløbskvalitet, så kravet til DVFI-værdi var opfyldt i forhold til målsætningen B1 for vandløbsstrækningen.

I Spang Å nedstrøms udløbet fra dambruget og opstrøms de tre rørudløb har DVFI-værdien været 5 i 2010 og 2011, hvorefter den var 4 i 2012 og 2013. De to seneste år i 2014 og 2015 har værdien været 5, og den biologiske vandløbskvalitet har således været ret god. Kravet til DVFI-værdi har således været opfyldt for vandløbsstrækningen, som har målsætningen B1.

3.4 Konklusion

Spang Å og tilløbet Nørre Møllebæk, der løber til Spang Å før udløbet fra Rakkeby Dambrug, er begge målsat til B1, dvs. "gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk". Kravet til DVFI-værdien for denne målsætning er mindst 5.

Undersøgelsen i marts 2015 af den biologiske vandløbskvalitet i Nørre Møllebæk har vist, at den har en DVFI-værdi på 5, dvs. en god biologisk vandløbskvalitet, og B1-målsætningens krav til DVFI er opfyldt. I forhold til den seneste undersøgelse i 2014 er der ikke sket nogen ændring i DVFI-værdien.

I Spang Å har undersøgelsen i marts 2015 vist, at opstrøms udløbet fra Rakkeby Dambrug har vandløbet en god biologisk vandløbskvalitet med en DVFI-værdi på 5. Nedstrøms dambrugets udløb, henholdsvis 100 m nedstrøms og opstrøms tre rørudløb, har Spang Å også en DVFI-værdi på 5. B1-målsætningens krav til DVFI-værdien er således opfyldt for Spang Å både opstrøms og nedstrøms udløbet fra dambruget, og vandløbet har en god biologisk vandløbskvalitet.

I forhold til 2014 er der sket en forbedring af DVFI-værdien fra 4 til 5 på stationen i Spang Å 100 m nedstrøms dambrugets udledning, mens der ikke er sket nogen ændring for de øvrige stationer, der i 2014 havde DVFI-værdien 5. Ved undersøgelse i marts 2015 havde den ene af de tre rørudløb nedstrøms dambrugets udledning lidt "lammehaler" i rørudløbet og belastede vandløbet med en del organisk stof. Årsagen til denne belastning samt en eventuel belastning med organisk stof fra de to andre rørudløb bør nærmere undersøges.



Lige efter udledningen fra Rakkeby Dambrug til Spangs Å findes tre rør, som udleder vand fra landbrugsområder. I rørudløbet langs sydbredden (højre side af billedet) var der på undersøgelsestidspunktet okker og lidt "lammehaler" af bakterier. Desuden var der lidt lammehaler langs sydbredden nedstrøms denne udledning. Forekomsten af lammehaler er en følge af udledning af en betydelig mængde organisk stof, og omfanget af denne belastning af Spang Å bør nærmere undersøges. Det gælder også for en eventuel belastning med organisk stof af vandløbet via de to andre rørudløb.

4 Referencer

Danmarks Miljøundersøgelser 2010. Teknisk anvisning for makroinvertebrater (smådyr) i vandløb. TS. Nr. V-07.

Miljøstyrelsen 1998. Vejledning fra Miljøstyrelsen. Nr. 5. Biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet.

5 Bilag

5.1 Bilag 1: Artlister for stationerne i 2015

Stationsnr: 2416-00002 Nørre Møllebæk
 Lokalitet: Kærgård
 Kortnr: 1116 IINV
 UTM-koor: 476603 6291332

Tilsynsdato: 17. mar 2015
 Vandområde: Spang Å
 Kommune: Morsø

Stationsoplysninger

Målsætning: B1 Målsætningsklasse: 5 God biol. vl.kvalitet

Prøvebedømmelse

DVFI faunaklasse: 5 God biol. vl.kvalitet DVFI opfyldt: Ja

Om prøven

Prøvetagningsudstyr: Standard-ketsjer 0,5 mm

Dimensioner

Fysiske forhold

Stationskarakter

Mæandrerende
 Høller og stryg
 Underskårne brinker
 Reguleret forløb
 Nyligt opgravet/ oprenset
 For bredt profil

Om bunden

[Belægninger og aflejringer](#)
 Okkerbelægninger

Om bunden (..)

[Vandløbsbunden](#)
 Blød bund
[Vandløbsbunden](#)
 Sten (> 60 mm)
 Gyde/groft grus (10-60 mm)
 Fint grus (3-10 mm)
 Sandvandring
 Rødder (skjul for fisk)
 Grene, sten (skjul for fisk)
 Grødebanker

Naturtype

Udhæng. vegetation

(X=Registreret, 1=Svag, 2=Middel, 3=Dominerende)

Bemærkninger

Faunaprøve

Artsnavn	Feltprøve	Pilleprøve	Sparkeprøve
TRICLADIDA, Triclade fimreorme			
Polycelis nigra		1	1
NEMATODA, Rundorme			
Nematoda indet.			1
OLIGOCHAETA, Børsteorme			
Oligochaeta indet.			1
OLIGOCHAETA II, Børsteorme			
Eiseniella tetraedra		2	1
HIRUDINEA, Igler			
Glossiphonia complanata		1	2
HYDRACARINA I, Vandmider			
Hydracarina indet.		2	3
OSTRACODA, Muslingekrebs			
Ostracoda indet.		1	8
ISOPODA			
Asellus aquaticus		1	1
EPHEMEROPTERA, Døgnfluer			
Baetis sp.		6	240
Leptophlebia marginata		4	32
PLECOPTERA, Slørvinger			
G Amphinemura sulcicollis		14	480
Nemoura cinerea		2	5
Nemurella picteti		1	3
HETEROPTERA, Tæger			
Velia sp.			1
COLEOPTERA, Biller			
Halipus sp.			1
Oreodytes sanmarkii		1	1
Agabus guttatus			1
COLEOPTERA III			
Elodes minuta gr.		1	2
Elmis aenea		1	3
TRICHOPTERA, Vårfluer			
Rhyacophila fasciata		4	6
Plectrocnemia conspersa		2	6
TRICHOPTERA II			
Athripsodes cinereus			1
Athripsodes sp.		2	3
TRICHOPTERA III			
Ecclisopteryx dalecarlica			1
Limnephilinae indet.		3	5
Limnephilus extricatus		1	2
Halesus sp.			1
DIPTERA I, Nematocera			
Tipula sp.			1
Limoniidae indet.			1
Pedicia rivosa		1	
Dicranota sp.		3	16
Eloeophila sp.		3	5
Scleroprocta sp.			1
Pericoma sp.			1
DIPTERA II			
Simuliidae indet.		12	52
Bezzia sp.		2	1
CHIRONOMIDAE			
Tanypodinae indet.		1	2
Diamesinae indet.		1	2
Prodiamesa olivacea		2	2
CHIRONOMIDAE II, Orthocladiinae			

Faunaprøve (..)

Artsnavn	Feltprøve	Pilleprøve	Sparkeprøve
Orthoclaadiinae indet.		2	16
Brillia sp		1	8
Diplocladius cultriger			2
CHIRONOMIDAE III, Chironominae			
Tanytarsus sp.		2	10
DIPTERA II, Brachycera			
Empididae indet.			1
GASTROPODA, PROSOBRANCHIA, NUDIBRANCHIA			
Potamopyrgus antipodarum		5	160
Lymnaea peregra			1
BIVALVIA, muslinger			
Pisidium sp.		1	5
Antal taxa/grupper: 47	Samlet antal individer i prøven:	86	1099
DVFI faunaklasse: 5	God biol. vl.kvalitet		
Diversitetsgrupper: Positive 11	Negative 3	Nøglegruppe 2	

Stationsnr: 2412-00014 Spang Å
 Lokalitet: Rakkeby Dambrug St. 2a
 Kortnr: 1116 IINV
 UTM-koor: 476214 6291081

Tilsynsdato: 17. mar 2015
 Vandområde: Spang Å
 Kommune: Morsø

Stationsoplysninger

Målsætning: B1 Målsætningsklasse: 5 God biol. vl.kvalitet

Prøvebedømmelse

DVFI faunaklasse: 5 God biol. vl.kvalitet DVFI opfyldt: Ja

Om prøven

Prøvetagningsudstyr: Standard-ketsjer 0,5 mm

Dimensioner

Fysiske forhold

Stationskarakter

Mæandrerende
 Høller og stryg
 Underskårne brinker
 Reguleret forløb
 Nyligt opgravet/ oprenset
 For bredt profil

Om bunden

[Belægninger og aflejringer](#)
 Okkerbelægninger

Om bunden (..)

[Vandløbsbunden](#)
 Blød bund
[Vandløbsbunden](#)
 Sten (> 60 mm)
 Gyde/groft grus (10-60 mm)
 Fint grus (3-10 mm)
 Sandvandring
 Rødder (skjul for fisk)
 Grene, sten (skjul for fisk)
 Grødebanker

Naturtype

Udhæng. vegetation

(X=Registreret, 1=Svag, 2=Middel, 3=Dominerende)

Bemærkninger

Faunaprøve

	Artsnavn	Feltprøve	Pilleprøve	Sparkeprøve
	TRICLADIDA, Triclade fimreorme			
	Polycelis nigra			1
	NEMATODA, Rundorme			
	Nematoda indet.		1	4
	OLIGOCHAETA, Børsteorme			
	Oligochaeta indet.		4	21
	Tubificidae indet.			2
	OLIGOCHAETA II, Børsteorme			
	Eiseniella tetraedra		1	1
	HIRUDINEA, Igler			
	Glossiphonia complanata		1	5
	Helobdella stagnalis		1	2
	HYDRACARINA I, Vandmider			
	Hydracarina indet.		1	10
	OSTRACODA, Muslingekrebs			
	Ostracoda indet.			4
	ISOPODA			
	Asellus aquaticus		1	4
	EPHEMEROPTERA, Døgnfluer			
	Baetis sp.		7	240
	Paraleptophlebia submarginata		5	21
	PLECOPTERA, Slørvinger			
G	Amphinemura sulcicollis		7	31
G	Nemoura avicularis		1	2
	Nemoura cinerea		3	5
	COLEOPTERA, Biller			
	Oreodytes sanmarkii			1
	Agabus guttatus			1
	COLEOPTERA III			
	Elmis aenea		1	6
	TRICHOPTERA, Vårfluer			
	Rhyacophila fasciata		4	5
	Plectrocnemia conspersa		1	2
	TRICHOPTERA II			
	Limnephilidae indet.		1	2
	TRICHOPTERA III			
	Ecclisopteryx dalecarlica		1	
	Limnephilus extricatus		1	2
	DIPTERA I, Nematocera			
	Limoniidae indet.			2
	Dicranota sp.		3	12
	Eloeophila sp.			1
	Scleroprocta sp.			1
	Pericoma sp.			1
	DIPTERA II			
	Simuliidae indet.		25	820
	CHIRONOMIDAE			
	Tanypodinae indet.		2	32
	Macropelopia nebulosa		2	16
	Diamesinae indet.		5	56
	Prodiamesa olivacea		3	48
	CHIRONOMIDAE II, Orthoclaadiinae			
	Orthoclaadiinae indet.		5	32
	Orthocladus sp.			1
	CHIRONOMIDAE III, Chironominae			
	Chironomini indet.		2	3
	Tanytarsus sp.		6	64
	DIPTERA II, Brachycera			
	Empididae indet.			2

Faunaprøve (..)

Artsnavn	Feltprøve	Pilleprøve	Sparkeprøve
GASTROPODA, PROSOBRANCHIA, NUDIBRANCHIA			
Valvata piscinalis			1
Potamopyrgus antipodarum		3	36
Lymnaea peregra		1	1
BIVALVIA, muslinger			
Pisidium sp.		1	5
Antal taxa/grupper: 42	Samlet antal individer i prøven:	100	1506
DVFI faunaklasse: 5	God biol. vl.kvalitet		
Diversitetsgrupper: Positive 8	Negative 4	Nøglegruppe 2	

Stationsnr: 2412-00015 Spang Å
 Lokalitet: Rakkeby Dambrug St. 2b
 Kortnr:
 UTM-koor: 476273 6291056

Tilsynsdato: 17. mar 2015
 Vandområde: Spang Å
 Kommune: Morsø

Stationsoplysninger

Målsætning: B1 Målsætningsklasse: 5 God biol. vl.kvalitet

Prøvebedømmelse

DVFI faunaklasse: 5 God biol. vl.kvalitet DVFI opfyldt: Ja

Om prøven

Prøvetagningsudstyr: Standard-ketsjer 0,5 mm

Dimensioner

Fysiske forhold

Stationskarakter

Mæandrerende
 Høller og stryg
 Underskårne brinker
 Reguleret forløb
 Nyligt opgravet/ oprenset
 For bredt profil

Om bunden

[Belægninger og aflejringer](#)
 Okkerbelægninger

Om bunden (..)

[Vandløbsbunden](#)
 Blød bund
[Vandløbsbunden](#)
 Sten (> 60 mm)
 Gyde/groft grus (10-60 mm)
 Fint grus (3-10 mm)
 Sandvandring
 Rødder (skjul for fisk)
 Grene, sten (skjul for fisk)
 Grødebanker

Naturtype

Udhæng. vegetation

(X=Registreret, 1=Svag, 2=Middel, 3=Dominerende)

Bemærkninger

Faunaprøve

Artsnavn	Feltprøve	Pilleprøve	Sparkeprøve
TRICLADIDA, Triclade fimreorme			
Polycelis nigra			1
NEMATODA, Rundorme			
Nematoda indet.			2
OLIGOCHAETA, Børsteorme			
Oligochaeta indet.		2	5
Naididae indet.			2
Tubificidae indet.			2
OLIGOCHAETA II, Børsteorme			
Eiseniella tetraedra			1
HIRUDINEA, Igler			
Glossiphonia complanata		1	2
Helobdella stagnalis			1
HYDRACARINA I, Vandmider			
Hydracarina indet.		2	10
OSTRACODA, Muslingekrebs			
Ostracoda indet.			2
ISOPODA			
Asellus aquaticus		1	2
EPHEMEROPTERA, Døgnfluer			
Baetis sp.		4	480
Leptophlebia marginata		4	12
PLECOPTERA, Slørvinger			
G Amphinemura sulcicollis		8	520
G Nemoura avicularis		1	2
Nemoura cinerea		2	5
COLEOPTERA, Biller			
Halipus sp.			1
Oreodytes sanmarkii			1
Agabus paludosus			1
COLEOPTERA III			
Elmis aenea		1	4
TRICHOPTERA, Vårfluer			
Rhyacophila fasciata		5	27
Plectrocnemia conspersa		1	2
TRICHOPTERA II			
Athripsodes cinereus			2
Athripsodes sp.		1	2
Limnephilidae indet.		1	5
TRICHOPTERA III			
Limnephilus extricatus		1	3
DIPTERA I, Nematocera			
Tipula sp.			1
Limoniidae indet.			1
Dicranota sp.		2	11
Eloeophila sp.			1
Scleroprocta sp.			1
Pericoma sp.			1
DIPTERA II			
Simuliidae indet.		8	520
Bezzia sp.			1
CHIRONOMIDAE			
Tanypodinae indet.		2	5
Macropelopia nebulosa		1	1
Diamesinae indet.		2	5
Prodiamesa olivacea		2	10
CHIRONOMIDAE II, Orthocladiinae			
Orthocladiinae indet.		4	15
Brillia sp.		1	5

Faunaprøve (..)

Artsnavn	Feltprøve	Pilleprøve	Sparkeprøve
Eukiefferiella brevicar		1	
CHIRONOMIDAE III, Chironominae			
Chironominae indet.		1	2
Tanytarsus sp.		2	10
DIPTERA II, Brachycera			
Hemerodromia sp.			1
GASTROPODA, PROSOBRANCHIA, NUDIBRANCHIA			
Valvata piscinalis		1	3
Potamopyrgus antipodarum		2	10
Lymnaea peregra			1
BIVALVIA, muslinger			
Pisidium sp.		2	5
Antal taxa/grupper: 48	Samlet antal individer i prøven:	66	1707
DVFI faunaklasse: 5	God biol. vl.kvalitet		
Diversitetsgrupper: Positive 9	Negative 4	Nøglegruppe 2	

Stationsnr: 2412-00016-VB Spang Å
 Lokalitet: Rakkeby Dambrug St. 1
 Kortnr: 1116 IINV
 UTM-koor: 476440 6291042

Tilsynsdato: 17. mar 2015
 Vandområde: Spang Å
 Kommune: Morsø

Stationsoplysninger

Målsætning: B1 Målsætningsklasse: 5 God biol. vl.kvalitet

Prøvebedømmelse

DVFI faunaklasse: 5 God biol. vl.kvalitet DVFI opfyldt: Ja

Om prøven

Prøvetagningsudstyr: Standard-ketsjer 0,5 mm

Dimensioner

Fysiske forhold

Stationskarakter

Mæandrerende
 Høller og stryg
 Underskårne brinker
 Reguleret forløb
 Nyligt opgravet/ oprenset
 For bredt profil

Om bunden

[Belægninger og aflejringer](#)
 Okkerbelægninger

Om bunden (..)

[Vandløbsbunden](#)
 Blød bund
[Vandløbsbunden](#)
 Sten (> 60 mm)
 Gyde/groft grus (10-60 mm)
 Fint grus (3-10 mm)
 Sandvandring
 Rødder (skjul for fisk)
 Grene, sten (skjul for fisk)
 Grødebanker

Naturtype

Udhæng. vegetation

(X=Registreret, 1=Svag, 2=Middel, 3=Dominerende)

Bemærkninger

Faunaprøve

	Artsnavn	Feltprøve	Pilleprøve	Sparkeprøve
	TRICLADIDA, Triclade fimreorme			
	Tricladida indet.			1
	Polycelis nigra		1	2
	NEMATODA, Rundorme			
	Nematoda indet.			1
	OLIGOCHAETA, Børsteorme			
	Oligochaeta indet.		1	6
	Naididae indet.		1	2
	OLIGOCHAETA II, Børsteorme			
	Eiseniella tetraedra		1	2
	HIRUDINEA, Igler			
	Glossiphonia complanata		2	12
	Helobdella stagnalis			1
	Hemiclipsis marginata			1
	HYDRACARINA I, Vandmider			
	Hydracarina indet.		2	3
	OSTRACODA, Muslingekrebs			
	Ostracoda indet.			3
	ISOPODA			
	Asellus aquaticus		1	2
	EPHEMEROPTERA, Døgnfluer			
	Baetis sp.		6	420
	Leptophlebia marginata		7	46
	PLECOPTERA, Slørvinger			
G	Amphinemura sulcicollis		12	160
G	Nemoura avicularis		1	2
	Nemoura cinerea		3	28
	Nemurella picteti		1	1
	HETEROPTERA, Tæger			
	Velia sp.			1
	COLEOPTERA, Biller			
	Halipus sp.			1
	Hydroporus angustatus		2	1
	Oreodytes sanmarkii		1	2
	Agabus guttatus			1
	COLEOPTERA III			
	Elmis aenea		2	24
	TRICHOPTERA, Vårfluer			
	Rhyacophila fasciata		5	4
	Plectrocnemia conspersa		2	3
	TRICHOPTERA II			
	Athripsodes sp.		1	2
	Limnephilidae indet.		2	4
	TRICHOPTERA III			
	Ecclisopteryx dalecarlica		1	
	Limnephilus extricatus		2	3
	DIPTERA I, Nematocera			
	Tipula sp.		1	1
	Limoniidae indet.		1	3
	Pedicia rivosa			2
	Dicranota sp.		3	8
	Eloeophila sp.		1	2
	Scleroprocta sp.		1	
	Molophilus sp.			1
	Pericoma sp.		1	1
	DIPTERA II			
	Simuliidae indet.		5	120
	CHIRONOMIDAE			
	Tanypodinae indet.		1	8


Faunaprøve (..)			
Artsnavn	Feltprøve	Pilleprøve	Sparkeprøve
Macropelopia nebulosa			1
Diamesinae indet.		1	5
CHIRONOMIDAE II, Orthocladiinae			
Orthocladiinae indet.		3	12
Brillia sp		3	6
Eukiefferiella brevicar		2	3
CHIRONOMIDAE III, Chironominae			
Chironomini indet.		1	2
Tanytarsus sp.		2	3
DIPTERA II, Brachycera			
Empididae indet.			1
GASTROPODA, PROSOBRANCHIA, NUDIBRANCHIA			
Potamopyrgus antipodarum		5	42
BIVALVIA, muslinger			
Pisidium amnicum		1	5
Antal taxa/grupper: 50	Samlet antal individer i prøven:	89	965
DVFI faunaklasse: 5	God biol. vl.kvalitet		
Diversitetsgrupper: Positive 10	Negative 3	Nøglegruppe 2	

5.2 Bilag 2: DVFI-værdier for årene 1999-2014

Dansk VandløbsFaunaIndeks

Stationsnr	WinBio Stationsnr	Stednavn	Lokalitet	Stationsejer
12000240	NST2416-00002	Kærgård	Nørre Møllebæk	Miljøcenter Aalborg

Kærgård (St. NST2416-00002)




Dato	Tilsynsejer	DVFI klasse	DVFI klasse betegnelse	Kvalitetssikringsniveau	Kvalitetsstatus
21-04-1999	Naturstyrelsen	5	God biologisk kvalitet	FagK	GODK
06-04-2000	Naturstyrelsen	4	Noget forringet biologisk kval	FagK	GODK
03-04-2003	Naturstyrelsen	5	God biologisk kvalitet	FagK	GODK
16-03-2004	Naturstyrelsen	5	God biologisk kvalitet	FagK	GODK
14-04-2005	Naturstyrelsen	5	God biologisk kvalitet	FagK	GODK
10-04-2006	Naturstyrelsen	5	God biologisk kvalitet	FagK	GODK
20-03-2007	Morsø	4	Noget forringet biologisk kval	IndK	GODK
13-06-2008	Morsø	4	Noget forringet biologisk kval	IndK	GODK
24-04-2010	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
17-03-2011	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
23-02-2012	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
11-04-2013	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
03-04-2014	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK

Dansk VandløbsFaunaIndeks

Stationsnr	WinBio Stationsnr	Stednavn	Lokalitet	Stationsejer
12000233	NST2412-00014	Rakkeby Dambrug St. 2	Spang Å	Miljøcenter Aalborg


Rakkeby Dambrug St. 2 (St. NST2412-00014)



Dato	Tilsynsejer	DVFI klasse	DVFI klasse betegnelse	Kvalitetssikringsniveau	Kvalitetsstatus
03-04-2003	Naturstyrelsen	4	Noget forringet biologisk kval	FagK	GODK
16-03-2004	Naturstyrelsen	4	Noget forringet biologisk kval	FagK	GODK
14-04-2005	Naturstyrelsen	4	Noget forringet biologisk kval	FagK	GODK
10-04-2006	Naturstyrelsen	4	Noget forringet biologisk kval	FagK	GODK
20-03-2007	Morsø	4	Noget forringet biologisk kval	IndK	GODK
13-06-2008	Morsø	3	Ringe biologisk kvalitet	IndK	GODK
30-04-2009	Morsø	4	Noget forringet biologisk kval	IndK	GODK
24-04-2010	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
17-03-2011	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
23-02-2012	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
11-04-2013	Morsø	4	Noget forringet biologisk kval	IndK	GODK
03-04-2014	Morsø	4	Noget forringet biologisk kval	IndK	GODK

Dansk VandløbsFaunaIndeks

Stationsnr	WinBio Stationsnr	Stednavn	Lokalitet	Stationsejer
12000416	NST2412-00015	Rakkeby Dambrug St. 2b	Spang Å	Miljøcenter Aalborg




Dato	Tilsynsejer	DVFI klasse	DVFI klasse betegnelse	Kvalitetssikringsniveau	Kvalitetsstatus
24-04-2010	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
17-03-2011	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
23-02-2012	Morsø	4	Noget forringet biologisk kval	IndK	GODK
11-04-2013	Morsø	4	Noget forringet biologisk kval	IndK	GODK
03-04-2014	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK

Dansk VandløbsFaunaIndeks

Stationsnr	WinBio Stationsnr	Stednavn	Lokalitet	Stationsejer
12000379	NST2412-00016-VBA	Rakkeby Dambrug St. 1	Spang Å	Miljøcenter Aalborg

Rakkeby Dambrug St. 1 (St. NST2412-00016-VBA)



Dato	Tilsynsejer	DVFI klasse	DVFI klasse betegnelse	Kvalitetssikringsniveau	Kvalitetsstatus
21-04-1999	Naturstyrelsen	4	Noget forringet biologisk kval	FagK	GODK
06-04-2000	Naturstyrelsen	5	God biologisk kvalitet	FagK	GODK
03-04-2003	Naturstyrelsen	5	God biologisk kvalitet	FagK	GODK
14-04-2005	Naturstyrelsen	5	God biologisk kvalitet	FagK	GODK
20-03-2007	Morsø	4	Noget forringet biologisk kval	IndK	GODK
13-06-2008	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
30-04-2009	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
24-04-2010	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
17-03-2011	Morsø	4	Noget forringet biologisk kval	IndK	GODK
23-02-2012	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
11-04-2013	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK
03-04-2014	Morsø	5	God biologisk kvalitet	IndK	GODK