
Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Morsø Kommune



INDSATSPLAN

Morsø Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø har på mødet den 12. marts 2025 vedtaget "Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo". Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger med frist for at indkomme med bemærkninger til Morsø Kommune på teknikogmiljo@morsoe.dk senest den 14. maj 2025 kl. 12.00.

Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til forslaget, og dette er derfor den endelige indsatsplan, der beskriver strategi og metodevalg for indsatsen overfor Kæmpebjørneklo i Morsø Kommune.

Formålet med indsatsplanen er at udrydde Kæmpebjørneklo i Morsø Kommune. Det betyder, at ingen Kæmpebjørneklo i kommunen på noget tidspunkt må sprede frø, og alle planter skal på sigt udryddes.

Indsatsplanen dækker hele Mors. Både kommunen og alle ejere af arealer med Kæmpebjørneklo har efter vedtagelse af nærværende plan derfor pligt til at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen.

Kommunen kan med indsatsplanen pålægge ejere af arealer, hvor der findes Kæmpebjørneklo at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med denne indsatsplan.

Indsatsplanen er udarbejdet med hjemmel i § 10 i Lov om drift af landbrugsjorder¹, med efterfølgende Bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo².

HVORFOR BEKÆMPE KÆMPEBJØRNEKLO?

Kæmpebjørneklo blev indført til Danmark som prydpilte i slutningen af 1800-tallet, og har siden spredt sig til naturen med stadig stigende hastighed. Det betegnes som en invasiv art, idet den ikke er naturligt hjemmehørende her i landet. Den kan danne store sammenhængende bestande, der udkonkurrerer den hjemmehørende vegetation. Planten udskygger al underliggende vegetation, hvorved artsdiversiteten falder. På arealer med Kæmpebjørneklo efterlades i vinterperioden store blottede arealer med risiko for udskridning af skrænter og brinker og erosion af store mængder jord til vandløbene. Se afsnittet "Beskrivelse af Kæmpebjørneklo" for nærmere beskrivelse af planten.

Derudover er det almindelig kendt, at Kæmpebjørneklo ved berøring kan forårsage smertefuld eksem, som kan være op til ½ år om at hele. Denne virkning forstærkes af sollys.

Ved en fælles indsats kan planten bekæmpes effektivt, men det kræver en koordineret og effektiv indsats, så planten en gang for alle kan udryddes. Denne indsatsplan er derfor tænkt som koordineringen af denne indsats, så den enkelte lodsejer sammen med Morsø Kommune kan danne fælles front mod planten, og derved på sigt få den udryddet.

¹ LBK nr. 1041 af 10/7/2023

² BEK nr. 842 af 23/06/2017

STRATEGI

Fra vækstsæson 2026 vil der blive ført tilsyn i hele kommunen på såvel store som små bestande af Kæmpebjørneklo. Tilsynet er koblet op på rapporteringer fra offentligheden via Tip Morsø – app'en, hvor borgere kan indrapportere fund med præcis lokalitet til kommunens driftsafdeling. På offentlig grund vil indrapporteringen straks blive fulgt op med en indsats, mens der ved indrapporteringer af fund på privat grund først vil ske en henvendelse til lodsejer med information om fundet, samt forpligtelserne i henhold til denne indsatsplan.

Tidsfrister for bekæmpelse

Bekæmpelsen skal gentages og kontrolleres flere gange i løbet af en sæson.

Bekæmpelse er foretaget effektivt, når ingen planter af Kæmpebjørneklo får mulighed for at udvikle og sprede frø det pågældende år.

Derfor er følgende minimumsfrister fastsat for bekæmpelse:

- Første bekæmpelse inden 1. maj
- Opfølgende bekæmpelse 2 gange i løbet af sommeren.
- Afsluttende bekæmpelse inden 1. september

Planter der opdages i løbet af vækstsæsonen, efter den 1. maj, skal bekæmpes senest 3 uger efter de er opdaget.

For at sikre størst effektivitet af indsatsen anbefales det, at man løbende holder øje med planten, så man kan sætte ind med bekæmpelse inden den sætter nye frø, da stress af planten kan bevirke en øget blomstring og frøsætning.

Tilsyn og opfølgning

Morsø Kommune fører tilsyn med arealer, hvorpå der er registreret Kæmpebjørneklo, og har til enhver tid, mod forevisning af behørig legitimation, adgang til arealer omfattet af indsatsplanen jf. § 13, stk. 2, i lov om drift af landbrugsjorder.

Overholdes indsatsplanens bestemmelser om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo ikke, kan Morsø Kommune udstede et påbud om, at bekæmpelsen skal foretages senest 3 uger efter påbuddets modtagelse.

Efterkommes påbuddet ikke kan kommunen foretage bekæmpelsen. Ved manglende efterkommelse af påbud kan kommunen foretage bekæmpelsen på ejerens eller brugerens regning. Prisen kan ikke overstige 3,81 kr. pr. kvadratmeter (2016 priser) væsentligt. Maksimumprisen, reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned.

Påbud vil kunne påklages til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø af de berørte lodsejere. Klagen skal indsendes til Morsø Kommune, som sender klagen videre til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø med kommunens kommentarer. En klage skal være modtaget inden 4 uger efter modtagelse af påbuddet.

Bekæmpelsesmetoder

Kæmpebjørneklo er en sejlivet plante, som dog ved rettidig omhu kan bekæmpes effektivt på få år.

Planterne er meget store og danner tit tætte bestande. Spredningen er desuden meget effektiv. Hver plante kan producere omkring 50.000 frø. Umodne frø af afhøstede blomsterskærme kan eftermodne og frøene kan i nogle tilfælde overleve kompostering og bevare spireevnen i mere end 10 år.

Hvilken metode, der er bedst at benytte til bekæmpelse af kæmpebjørneklo, afhænger af, hvor store bestande, der er tale om.

Morsø Kommune anbefaler anvendelse af de manuelle metoder, da de er mest effektive og mest skånsomme overfor miljøet. Anvendes kemisk bekæmpelse, skal alle sikkerhedsmæssige og miljømæssige forskrifter overholdes, og der skal tages hensyn til at bekæmpelsesmetoden ikke må være til skade for økologiske bedrifter.

Beskyt dig mod Kæmpebjørnekloens saft

Kæmpebjørnekloens saft gør huden ekstremt følsom over for sollys og kan give alvorlige forbrændinger. Påvirkede hudområder kan være følsomme over for sollys i årevis. Når man bekæmper Kæmpebjørneklo, er det derfor vigtigt, at man undgår hudkontakt med planten, også selvom solen ikke skinner.



Dæk hele kroppen med handsker og tøj, helst i syntetiske vandafvisende materialer. Hvis du skal slå planten, bør du beskytte dit ansigt med visir eller beskyttelsesbriller. Pas på ikke at klø i ansigtet eller på anden hud med handskerne på.

Fortag så vidt mulig bekæmpelsen tidligt eller sent på dagen, når solen står lavt.

Gør det til en vane at vaske udsatte hudpartier (typisk ansigt, hals, hænder og underarme), hver gang der er en pause.

Får du plantesaft på huden, skal du inden 20 minutter vaske huden med vand og sæbe, og hudområdet skal beskyttes mod sollys i mindst 48 timer. Evt. kontakt lægen i forbindelse med forbrændinger.

Rodstikning

Rodstikning foregår med en almindelig spade, som bør skærpes undervejs. Ved at skære plantens rod over under vækstpunktet dør den. Vækstpunktet ligger typisk nul-to cm under jordoverfladen, så det er normalt tilstrækkeligt at rodstikke planten i to-tre cm's dybde. Tidligere anbefalede man at rodstikke i ti cm dybde eller grave hele roden op, men erfaringen har nu vist at det ikke er nødvendigt for at slå planten ihjel. Rodstikning kan være mindre effektiv overfor hårfrugtet bjørneklo, her kan det anbefales at grave hele roden op, hvis rodstikning ikke er tilstrækkelig.

Vækstpunktet sidder, hvor bladene udspringer. Derfor er det tilstrækkeligt at stikke roden over lige under vækstpunktet, dvs. at bladene med det øverste stykke af roden skal helt op af jorden. En god sammenligning er gulerødder med top; når man skærer toppen af gulerødder med en kniv, skærer man også det øverste stykke af roden. Det er også præcis sådan Kæmpebjørneklo skal rodstikkes.

Rodstumpen med bladet på kan gro videre, hvis den lægges på fugtig, bar jord. Det anbefales derfor at lægge de opgravede rodstykker sådan, at de ikke har jordkontakt.

Rodstikning kan foregå i hele vækstsæsonen, men arbejdet er lettest enten om foråret, hvor planterne er små, og hvor det ikke er så varmt, eller om efteråret, hvor temperaturen er faldet, og bladene ikke længere er fyldt med saft. Rodstikning kan benyttes i spredte bestande, eller skyggeundertrykte bestande i krat, hvor der ikke er risiko for at aktivere frøbanken.

Det er ikke effektivt at rodstikke i tætte bestande, førend at frøsætning har været forhindret i to-tre år. Når en voldsomt frøsættende bestands plantetæthed ved skærmbkapning er kommet ned på 20-50 planter/m² kan rodstikning påbegyndes. Er man for ivrig og bortgraver tætte bestande, risikerer man året efter at stå med 100 gange så mange planter.

Rodstikning er en meget effektiv metode, som muliggør en ret hurtig udryddelse af planten, hvis det gøres systematisk. Når metoden er indøvet, kan der under gode forhold rodstikkes op mod 300 planter i timen. Rodstikning er hårdt fysisk arbejde, men effektiviteten på lang sigt gør den til en højst anbefalet metode i selv store bestande.

Slåning

Slåning kan enten gøres maskinelt eller med le. Ved maskinel slåning kan der dannes tåger af giftig plantesaft, derfor bør det ske i maskiner med lukket førerhus og med bagmonteret klipper. Ved anvendelse af buskrydder til manuel slåning bør der ikke bruges snøre, da denne ophvirvler en tåge af giftig plantesaft.

Planten dør ikke af slåning og kan overleve selv i græsplæner, der slås ofte. Væksten hæmmes dog noget, og rodens energireserver tømmes langsomt, men hvis man ikke sørger for at slå meget hyppigt (mindst 6 gange årligt), vil man blot give bestanden en fordel, idet man slår de store planter, så der kommer lys til de små, og derved kan slåning give en tættere bestand.

Skærmbkapning

Det optimale tidspunkt for skærmbkapning er lige når de blomstrende planter begynder at sætte frø. På dette tidspunkt har roden opbrugt næsten al sin energi, så der er sjældent energi til endnu en blomstring. Samtidig er frøene så uudviklede, at de ikke kan færdigmodne, hvis de fjernes fra planten. Skærmbkapning foretages med en meget skarp le, eller med en machete.

Skærmbkapningen skal ske, inden frøene bliver modne (ca. 20. juli), og skærmen skal adskilles fuldstændigt fra stænglen, ellers vil frøene færdigmodne ved at suge energi fra stænglen. Det er vigtigt, at plantens store grundblade skæres af, da de ellers kan levere energi til roden, hvorved der helt sikkert kommer panikblomster. Når stænglen er fældet, skal man slå skærmen af så højt oppe som muligt. Hvis man blot fælder stænglen, vil frøene suge næring til sig fra stænglen og færdigmodne på denne.

Afdækning

Velafræsede bestande i åbent land kan med fordel afdækkes, enten med presenning, ukrudtsdug eller med UV-uigennemtrængeligt plast. Når Kæmpebjørneklo dækkes til, visner den ned og afdækning kan i bedste tilfælde udrydde 98-99% af planterne. Metoden er yderst anbefalelsesværdig, da den er meget effektiv, og da der kun er lille kontakt med planten. Året efter ses meget lille overlevelse og næsten ingen fremspiring fra frøbanken.

Arealet, der afdækkes, bliver helt barjordnet, men fjernes afdækningen i løbet af august måned, vil mange danske planter overleve eller indfinde sig, og ofte vil meget af den omgivende vegetation indfinde sig i løbet af efteråret, således at erosionsrisikoen mindskes.

Afdækning er forbundet med en meget stor overvågningsindsats, idet planterne kan bryde igennem, eller afdækningen kan blæse af. Ligger afdækningen godt i en periode med høj sol, kan man være heldig, at alle planterne under afdækningen er døde i løbet tre-fire måneder.

Jordbehandling

Jordbehandling som fræsning, pløjning og harvning er meget effektive metoder til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Jordbehandling skal foregå tre-fire gange fra april til september. Er der en

meget stor frøbank, kan udryddelse være fem år, men oftest vil jordbehandling over et par år udrydde de fleste bestande.

Inden jordbehandling påbegyndes, skal det sikres, at det er tilladt i det pågældende område, eller at man har dispensation til behandlingen. Således må jordbehandling ikke foregå i naturområder omfattet af naturbeskyttelsesloven, på braklagte marker omfattet af driftsbetingede støtteordninger og i vandløbsbræmmer ved vandløb.

Genopdyrkning

Genopdyrkning er generelt kun relevant på landbrugsarealer, men kan være en meget effektiv måde at udrydde store bestande af Kæmpebjørneklo. Kæmpebjørneklo er ikke et markukrudt og forsvinder hurtigt (2 år) på arealer med intensiv drift. På økologiske marker, kan det være nødvendigt med 1 års forudgående intensiv pløjning inden dyrkning. Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for braklagte arealer.

Græsning

Græsning er en særdeles effektiv måde at bekæmpe Kæmpebjørneklo på. Får er især gode til at spise planten, mens kvægs indsats afhænger af race. Ligeledes skal kvæg gerne vænne sig til planten før de æder løs, hvor imod får ofte æder Kæmpebjørneklo før andre planter.

Bemærk at succes ofte kræver en erfaren dyreholder, et erfarent voksent dyr, der kan oplære flokken i at spise planten og anvendelse af de rigtige racer. Følgende nordiske fåreracer er velegnede: Gute, Spelsau, Lüneburger, Såne. Følgende kvægracer er velegnede: Galloway, Skotsk Højland og Dexter (sidstnævnte især på utilgængelige våde steder).

Dyrene kan med fordel sættes tidligt ud i stort antal (20-30 får eller 8-10 kvæg pr. ha), så kan selv enorme bestande hurtigt decimeres. Når Kæmpebjørnekloens grokraft svækkes først på sommeren, sænkes græsningstrykket til 5-10 får (2-3 kvæg) pr. ha. Vær meget opmærksom på at græssende dyr også kan få skader af Kæmpebjørnekloens saft. Hvis dyrene får skader af plantesaften, i form af forbrænding og betændelse, skal de fjernes fra arealet og fra direkte sollys.

Kemisk bekæmpelse

Pesticider kan være effektivt til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Danmark. Ønsker man at bruge pesticider til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo anbefales det at starte bekæmpelsen tidligt om foråret, når planterne er 20-25 cm høje. På dette tidspunkt er det muligt at få adgang til hele bestanden. På dette tidspunkt har planten heller ikke vokset sig over knæhøjde. Er planterne over knæhøjde er åndedrætsværn påbudt.

Da der kan spire planter efter den første behandling, kan det være nødvendigt med endnu en behandling inden udgangen af maj.

Sprøjtning skal ske i tørt og stille vejr, og bør foretages således, at kun bjørnekloplanterne behandles. Spørg forhandler af bekæmpelsesmidlet om, hvilken metode til påførsel, der skal anvendes.

Hvis kemisk bekæmpelse foretages i erhvervsmæssigt øjemed, skal man have enten et sprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis.

Ved sprøjtning på beskyttede arealer skal man forud for bekæmpelsen indhente dispensation fra den relevante myndighed ift. gældende lovgivning. For eksempel kræver det en forudgående dispensation fra kommunen at sprøjte på §3-beskyttede arealer.

Valg af bekæmpelsesmetode ud fra arealtype

Vælg herunder hvilken type areal, bekæmpelsen skal foregå på. Det kan herefter aflæses, hvilken metode der egner sig til hhv. små, store og meget store bestande af Kæmpebjørneklo.

Vurderingen af metoder er baseret på en afvejning af tidsforbrug, effektivitet, arbejdsmiljø og påvirkning på natur og miljø. Angivelserne er vejledende og bygger på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs anbefalinger.

Vandløbskant og vandløbsbræmme

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning	Manuel slåning Græsning	Afdækning Maskinel slåning	Jordbehandling Genopdyrkning

Stor bestand, fra 1.000 til 10.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning	Manuel slåning Afdækning Maskinel slåning		Jordbehandling Genopdyrkning

Meget stor bestand, over 100.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
	Rodstikning Skærmkapning Afdækning Manuel slåning Græsning	Maskinel slåning	Jordbehandling Genopdyrkning

Hegn, Remiser, Krat m.m.

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning	Græsning	Manuel slåning Afdækning Jordbehandling Maskinel slåning Genopdyrkning	

Stor bestand, fra 1.000 til 10.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning Græsning	Afdækning Maskinel slåning	Manuel slåning Jordbehandling Genopdyrkning	

Meget stor bestand, over 100.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Græsning	Rodstikning Skærmkapning Afdækning Maskinel slåning	Manuel slåning Jordbehandling Genopdyrkning	

Enge, Moser, Naturarealer m.m.

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning Græsning	Manuel slåning	Maskinel slåning	Afdækning Jordbehandling Genopdyrkning

Stor bestand, fra 1.000 til 10.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning Græsning	Manuel slåning Maskinel slåning		Afdækning Jordbehandling Genopdyrkning

Meget stor bestand, over 100.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Græsning	Rodstikning Skærmkapning Maskinel slåning	Manuel slåning	Afdækning Jordbehandling Genopdyrkning

Langs veje

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning	Manuel slåning Jordbehandling	Afdækning Maskinel slåning Genopdyrkning Græsning	

Stor bestand, fra 1.000 til 10.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning Afdækning	Manuel slåning Jordbehandling Maskinel slåning	Genopdyrkning Græsning	

Meget stor bestand, over 100.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Afdækning	Rodstikning Skærmkapning Jordbehandling Maskinel slåning	Manuel slåning Genopdyrkning Græsning	

Industrigrunde

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning	Jordbehandling	Manuel slåning Afdækning Maskinel slåning Genopdyrkning Græsning	

Stor bestand, fra 1.000 til 10.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning Afdækning Jordbehandling	Manuel slåning Maskinel slåning Græsning	Genopdyrkning	

Meget stor bestand, over 100.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Afdækning Jordbehandling	Rodstikning Skærmkapning Maskinel slåning Græsning	Manuel slåning Genopdyrkning	

Landbrugsarealer

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning	Jordbehandling Græsning	Manuel slåning Afdækning Maskinel slåning Genopdyrkning	

Stor bestand, fra 1.000 til 10.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning Afdækning Jordbehandling Genopdyrkning Græsning	Manuel slåning Maskinel slåning		

Meget stor bestand, over 100.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Afdækning Jordbehandling Genopdyrkning Græsning	Rodstikning Skærmkapning Maskinel slåning	Manuel slåning	

ANDEN LOVGIVNING OG GRÆSNING

Naturområder som enge og moser er omfattet af beskyttelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. Der er ingen generelle regler for, hvor stort et indgreb skal være, for at der kræves dispensation. Generelt er det dog ikke nødvendigt at søge tilladelse til at etablere græsning i disse områder. Derimod er der normalt forbud mod græsning på vandløbsbrinker samt i byzoner.

Henvend dig til kommunen hvis du har spørgsmål vedrørende græsning.

BEKÆMPELSE LANGS VANDLØB

Ved offentlige vandløb foretager kommunen vandløbsvedligeholdelsen fastlagt i vandløbsregulativer for de enkelte vandløb. Vandløbsvedligeholdelsen sker af hensyn til vandløbets vandaflledningsevne. Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo på vandløbsbrinker er derfor omfattet af den kommunale vandløbsvedligeholdelse, da "nøgne" brinker i vinterhalvåret kan forårsage skred og sedimenttransport i vandløbet. Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo på 2 meter bræmmerne langs vandløbene påhviler de enkelte lodsejere.

OFFENTLIGGØRELSE OG HØRING

Den endeligt vedtagne indsatsplan kan indenfor 4 uger efter offentliggørelsen påklages til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø af de berørte lodsejere, Landbrug og Fødevarer, samt Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, jf. § 6 i bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.

En klage har ikke opsættende virkning.

EVALUERING

Indsatsplanen gælder fra 2026 og frem. Når der er gået mindst 3 hele vækstsæsoner fra endelig vedtagelse og offentliggørelse af indsatsplan evalueres planen af Morsø Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø. På det tidspunkt vil det være muligt at vurdere om den gældende indsatsplan har tilstrækkelig effekt på bekæmpelsen af Kæmpebjørneklo.

Hvis lovgrundlaget for indsatsplanen ændres, kan planen til enhver tid justeres.

BESKRIVELSE AF KÆMPEBJØRNEKLO

Kæmpebjørneklo (*Heracleum mantegazzianum*) er en prægtig plante med sin imponerende størrelse og lysende hvide skærme. Kæmpebjørneklo hører i Danmark til noget af det mest frygtede landskabsukrudt, da den udkonkurrerer al hjemmehørende vegetation på de invaderede steder, og skaber risiko for jordskred på skrånninger.

Kæmpebjørneklo er som regel to-årig og bliver det andet år 2-4 m høj, nogle gange endnu højere. Stænglen kan være op til 10 cm tyk og er stivhåret med røde pletter. Bladene er store og saftiggrønne, ofte meterlange og fjersnitdelte. Blomsterne er små og hvide og sidder i store skærme; den midterste skærm kan være over en halv meter i diameter.

Det vigtigste kendetegn til at skelne Kæmpebjørneklo fra de nævnte arter er: Højden (over 2-3 m), den store brede skærm og det mangebladede småsvøb.

Kæmpebjørneklo spredes ved hjælp af frø. En stor plante sætter omkring 50.000 frø og ca. 23 procent af dem kan spire. Dette betyder, at én plante teoretisk kan blive til ca. 12.000 planter, der tilsammen kan producere 60 millioner frø - på bare 2 år! Heldigvis spredes frøene ikke altid til voksesteder, hvor der er plads til at spire. Men eksemplet viser, at bare én enkelt plante vil kunne dække et stort areal i løbet af 1-2 generationer, hvis man ikke bekæmper den. Frøene kan bevare spireevnen i jorden i mindst 10 år.

Frøene er flade, lette og hindeagtige og kan blæse langt omkring. Desuden flyder frøene fint i vand, og da Kæmpebjørneklo gerne vokser langs med vandløb, kan den sprede sig langt omkring i et større vandløbssystem og derfra for eksempel ind på vandløbsbræmmer, i enge og overdrev.

I mørket under Bjørneklo-planterne kan andre planter ikke trives. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under Kæmpebjørneklo, kun nogle få insekter og snegle kan leve her.

Planten dør når den har sat frø. Kæmpebjørneklo blomstrer i juni og juli, og frøene spredes fra august til oktober.

I Danmark findes der andre store skærmplanter, som kan forveksles med Kæmpebjørneklo, f.eks. Almindelig Bjørneklo, Grønblomstret Bjørneklo, Strand-Kvan og Angelik. Ingen af disse arter er landskabsukrudt og bør derfor ikke bekæmpes.



Almindelig Bjørneklo



Grønblomstret Bjørneklo



Strand-Kvan



Angelik



YDERLIGERE OPLYSNINGER

For yderligere spørgsmål vedrørende indsatsplanen, anmeldelse og bekæmpelse af Kæmpebjørneklo henvises til Natur og Miljø på tlf. 99 70 70 00 eller e-mail: teknikogmiljo@morsoe.dk.

Indsatsplanen samt diverse informationer om planten, bekæmpelsesmetoder, sikkerheds- og arbejdsmæssige forhold, man bør tage hensyn til, kan findes på Morsø Kommunes hjemmeside www.morsoe.dk.

KILDER OG HENVISNINGER

www.retsinfo.dk (love og bekendtgørelser).

www.sgavmst.dk (lovgivning om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo, samt bekæmpelsesmetoder).